

مادر گرامی

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در خصوص نگهداری از فرزند دل‌بندتان و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می‌باشد.

تاکی پنه گذاری نوزدان



تاکی پنه گذاری نوزادان به معنای تنفس سخت و تند ناشی از تاخیر در جذب مایع باقی مانده از زمان جنینی در ریه نوزاد می باشد.

علت این تنفس تند و سخت این است که ریه‌های نوزاد در تلاشند تا اکسیژن بیشتری به دست بیاورند. در طول رشد دوران جنینی ریه‌ها حاوی مایع هستند. وقتی نوزاد به نزدیک تولد می‌رسد، بدن وی شروع به جذب مایع مزبور می‌کند به طوری که ریه‌ها بتوانند برای تنفس هوا پس از تولد آماده شوند.

چه نوزادانی مبتلا می شوند؟

- ✓ نوزادان نارس
- ✓ نوزاد بالغی که به طریق سزارین متولد شده اند
- ✓ سزارین تسریع شده
- ✓ همه نوزادانی که در پاکسازی مایع از ریه دچار مشکل بوده اند
- ✓ نوزادان مادر دیابتی و آسماتیک



عوامل خطر کدامند؟

- ✓ آسم و دیابت مادری
- ✓ نوزادان نارس دچار سندرم دیسترس تنفسی
- ✓ نوزادان بالغ که مایع آمنیوتیک مکونیومی داشته اند
- ✓ بیماری های تنفسی نوزادان مخصوصاً سندرم زجر تنفسی در جنس پسر و در متولدین سزارین انتخابی
- ✓ بیش از متولدین سزارین اورژانسی و زایمان طبیعی بوده است

علائم:

- ✓ احساس تنگی نفس
- ✓ بروز رنگ آبی روی انگشتان و لب ها
- ✓ به داخل کشیده شدن یا تورفتن قفسه سینه به هنگام نفس کشیدن

شماره سند:

OAH/B-9/PA/02/00

تاریخ تدوین:

۴۰۰/۲/۲۵

تاریخ بازنگری: ۴۰۲/۸/۲۵



تاکی پنه گذاری نوزدان



بیمارستان تخصصی زنان حضرت ام البنین (س)

فواید دستگاه حمایت تنفسی :

- ✓ بهبود اکسیژن رسانی
- ✓ بهبود بخشیدن به عملکرد ریه
- ✓ جلوگیری از روی هم خوابیدن بافت ریه
- ✓ کاهش احتمال قطع تنفس

علائم بهبودی:

- ✓ کاهش تعداد تنفس
- ✓ تنفس منظم و از بین رفتن تنفس سخت
- ✓ برطرف شدن کبودی انتهای اندام ها
- ✓ بعد از برطرف شدن علائم و تغذیه کامل از سینه مادر نوزاد آماده ترخیص می باشد.

منبع: <https://medlineplus.gov2020>

درمان:

دیسترس خفیف تنفسی به علت تاکی پنه گذاری نوزاد اغلب طی ۴ ساعت اول پس از تولد وقتی که باقیمانده مایع ریه باز جذب می شود بهبود می یابد، اگر دیسترس تنفسی بیش از ۴ ساعت ادامه یابد نوزاد به ارزیابی بیشتر و رادیوگرافی قفسه سینه برای تایید تشخیص نیاز دارد. بهبودی معمولاً ظرف ۲ الی ۳ روز صورت می گیرد و درمان حمایتی است که شامل دادن اکسیژن و پالس اکسی متری می باشد. در صورتی که دیسترس تنفسی بدتر شد، بسته به شرایط نوزاد تصمیم گیری می شود. که معمولاً نوزاد تحت حمایت تنفسی با دستگاه قرار می گیرد.