



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان تخصصی زنان ام البنین



تاریخ آخرین
بازنگری: 402/8/12

تاریخ بازنگری بعدی:
404/8/23

نوزاد با بلع مدفوع در رحم



بیمارستان ام البنین (س): نبش بهجت ۱۶
شماره تلفن بیمارستان: ۶۴-۳۲۳۱۰۶۱



منابع:

(ACORN) ترجمه: دکتر عباس حبیب الهی و

گروه مترجمین

کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه
نوزادان ، ویرایش پنجم، ترجمه : ملیحه کدیور

<https://medlineplus.gov/2020>

مراقبت در منزل:

آگاهی به علائم خطر نوزادی مثل کنترل تنفس های
نوزاد (تند و عمیق) ، خواب آلودگی ، کاهش
هوشیاری ،

کبودی در لبها ، زبان و ناخنها

پیگیری ادامه ی درمان طبق تجویز پزشک

تنظیم دمای اتاق در حد 25 درجه

عدم حضور نوزاد در محیط های شلوغ و پر تجمع



مادر گرمی

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در خصوص نگهداری از فرزند دلبندتان و چگونگی روند درمان و مراقبت آن میباشد.

مراقبت از نوزاد با بلع مدفوع در رحم

مادر قبل یا حین تولد:

نوزادی که قبل از تولد و یا هنگام تولد به دلایلی مدفوع خود را که به آن مکونیوم می گویند خورده باشد.

مکونیوم یا همان مدفوع جنینی در هنگام بارداری در هفته 16 - 10 بارداری در روده جنین تولید شده و بطور طبیعی تا بدو تولد دفع نمی شود مکونیوم اولین مدفوع نوزاد است .

وقتی جنین به علت کمبود اکسیژن تحت استرس و فشار است حرکات روده جنین تحریک شده و درپچه مقعد شل می شود و مکونیوم به فضای مایع آمنیوتیک ریخته می شود که جنین در آن مایع شناور است.

اسپیراسیون مکونیوم وقتی اتفاق می افتد که جنین در داخل رحم یا نوزاد با اولین تنفس پس از تولد، مکونیوم و مایع آمنیوتیک را به داخل ریه ها ببرد.

فاکتورهای خطر:

دیابت مادری، فشارخون مادری، زایمان سخت، کاهش میزان اکسیژن رسانی به جنین

علائم بالینی:

تنفس مشکل / عدم تنفس

شل بودن نوزاد زمان تولد

تنفس سریع

کبودشدن نوزاد

چروک خوردن پوست اطراف زانوها، زیربغل و باسن
بستر ناخن و پوست اغلب به رنگ زرد یا سبز در آید.

قفسه سینه، بشکه ای (برآمده) به نظر می رسد.



*این بیماری در نوزادان رسیده یا دیررس شایع

میباشد و به ندرت در نوزادان متولد شده در زیر 36 هفته مشاهده می شود.

درمان:

تخلیه ترشحات دهان و بینی نوزاد حین زایمان

اکسیژن درمانی ، سرم تراپی

درمان با آنتی بیوتیک

فیزیوتراپی تنفسی نوزاد

در صورت نیاز استفاده از دستگاه های کمک به تنفس

