



فرم آموزش به بیمار و خانواده در زمان ترخیص

سازارین

Unit Number:

شماره پرونده:

Attending physician:	پزشک معالج:	Ward:	بخش:	Name:	نام:	Family Name	نام خانوادگی:
Date of Admission:	تاریخ پذیرش:	Room:	اتاق:				
		Bed:	تحت:	Date of birth:	تاریخ تولد:	Father Name:	نام پدر:

تشخیص نهایی: سازارین تاریخ ترخیص: تلفن بخش: کد همکری دارو و آزمایشات نسخه شده:

غیره

پی گیری

ترخیص با میل شخصی

بهبودی نسبی

مددجوی گرامی: لطفاً مطالب این فرم را به دقت مطالعه نمایید و تهیه داروهای نسخه شده و یا انجام آزمایشات درخواستی را فراموش نکنید.

نحوه صحیح مصرف دارو	زمان مصرف در روز	میزان مصرف در روز	نام دارو	آموزش دارو
ناشتا <input type="checkbox"/> قبل از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> زمان خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد				
ناشتا <input type="checkbox"/> قبل از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> زمان خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد				
ناشتا <input type="checkbox"/> قبل از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> زمان خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد				
ناشتا <input type="checkbox"/> قبل از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> زمان خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد				

استفاده از میوه و سبزی جات تازه و لبنتیات در دوران شیردهی مناسب است. در صورت بیوست از روغن زیتون و آلو و انجیر خشک خیس کرده استفاده نمایید. مصرف مایعات فراوان توصیه می شود.

سعی کنید مرتب راه بروید به خاطر داشته باشید داشتن استراحت کافی در فواصل فعالیت به تسریع بهبودی دوران پس از زایمان کمک میکند.

روز سوم بعد از عمل و روز در میان دوش ایستاده بگیرید(حداکثر یک ربع ساعت) و محل بخیه ها را با شامپو و با دست شستشو دهید و پس از حمام بخیه ها خشک شود.

در صورت بروز هر گونه مشکل مانند درد شدید و خونریزی شدید و ادامه دار، تب و ترشح چركی از محل بخیه ها به مرکز درمانی مراجعه نمایید و در صورت مشکل در امر شیردهی با بیمارستان تماس بگیرید.

نتیجه آزمایشات درخلاصه پرونده قید شده و در اختیار بیمار قرار گرفته است

وضعیت نادرست پستان گرفتن شیرخوار و مکیدن فقط نوک پستان شایع ترین علت زخم نوک پستان است مالیدن چند قطره از شیر مادر روی ترک پستان و ماساژ و کمپرس گرم پستان قبل از شیر دهی و قراردادن نوک پستان در معرض هوا و نور خورشید به بهبود زخم نوک پستان کمک می کند در صورت احتقان پستان و پری پستان استفاده از کمپرس گرم و دوشیدن شیر توصیه می شود.

-1

-2

آموزش دارو

تفصیله

استراحت و فعالیت

پیشگیری از تأثیر مکمل

علائم فطری

نتایج آزمایشات

خدماتی و حقوقی

سوداگری پذیرشی

شنبه

مددجوی گرامی:

پس از مطالعه مطالب این فرم، هر گونه سوال یا ابهام احتمالی را یادداشت نموده و تا قبل از خروج از بیمارستان از پرستار خود سوال نمایید.
**مددجویانی که بیمه تامین اجتماعی دارند، کد ملی خود را جهت دریافت دارو و یا انجام آزمایشات ارائه نمایند. برای سایر بیمه ها پس از ثبت نسخه کد رهگیری اعلام می شود.

*در صورت وجود هرگونه سوال در زمینه بیماری خود می توانید همه روزه (به جز روزهای تعطیل) از ساعت ۸ تا ۱۲ با کلینیک های پرستاری آموزش سلامت ۰۵۱۳۲۲۳۱۰۶۱ - داخلی (۳۵۱) تماس بگیرید.
امضاء/اثر انگشت بیمار یا همراهی
مهر و امضای پزشک